대 한 부 인 종 양 학 회

Korean Society of Gynecologic Oncology

Homepage: www.sgo.or.kr / E-Mail: gyncancer@gyncancer.or.kr

(우: 06044) 서울특별시 강남구 강남대로 132 길 36, 102 호

Tel: 02) 512-5915 / Fax: 02) 512-5421

일 시: 2026. 10. 29 (목)

대부종: 제 2026-119 호

수 신: 대한부인종양학회 회원 귀하

제 목: 건강보험심사평가원_암환자에게 처방·투여하는 약제에 대한 공고 개정 (PAOLA-1) 안내의 건

1. 회원님의 안전과 평안을 기원합니다.

2. 아래는 2026. 10. 28 건강보험심사평가원이 발표한 [암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 '요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부 사항']에 관한 공고 내용입니다. PAOLA-1 요법이 기존 병용요법에서 삭제되고 급여로 변경되는 내용입니다.

   이 공고는 2026 년 11 월 1 일부터 시행됨을 안내드립니다. 이번 개정은 보험위원회 위원장(노재홍, 서울의대), 간사(노준호, 서울의대), 12 명의 위원들의 헌신과 노고를 바탕으로 이루어진 결과로, 회원 여러분들께 그 내용을 안내드리고자 합니다. 향후 지속적으로 건강보험심사평가원과 협의를 진행하도록 하겠습니다.

<삭제>

- 기타 항암제 병용요법 (기존 항암요법 본인일부부담)에 요법 삭제
  난소암(1 요법): 'Bevacizumab + Paclitaxel + Carboplatin → Bevacizumab + Olaparib'

<신설>

- 유지요법(maintenance)

연번	항암요법	투어대상	투여단계
3	olaparib(tablet) + bevacizumab 주 3	1 차 백금 기반 항암화학요법과 베바시주맙 병용투여 요법에 반응(CR 또는 PR)한 상동재조합결핍 양성 (BRCA 변이 또는 유전체 불안정성)인 고도 상피성 난소암, 난관암, 일차 복막암 ※ Bevacizumab 은 7.5mg/kg 로 투여함 ※ Olaparib 은 최대 2 년, Bevacizumab 은 1 차 백금 기반 항암화학요법을 포함하여 최대 15 개월까지 급여 인정함	-

주 3. 'Bevacizumab + Paclitaxel + Carboplatin' 병용요법 종료 후 7 주기부터 해당 유지요법을 투여하며, 이전에 PARP 억제제를 투여 받은 적이 없어야 함

3. 감사합니다. 끝

대한부인종양학회 회 장 이 재 관